



## VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Kifüggetés: 2024.05.24  
Lejárt: 2024.07.08.



A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal, mint növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró szerv (továbbiakban élelmiszerlánc-felügyeleti szerv) a **szőlő aranszínű sárgaság fitoplazma (*Grapevine flavescence dorée phytoplasma*) zárlati károsítót terjesztő amerikai szőlőkabóca ellen az alábbi 2024. évre vonatkozó első védekezési felhívást teszi közzé a Balaton-felvidéki borvidék és a Badacsonyi borvidék vonatkozásában:**

### VÉDEKEZÉSI FELHÍVÁS

A Balaton-felvidéki borvidék és a Badacsonyi borvidék szőlőnövényein, szőlőültetvényeiben az amerikai szőlőkabóca (*Scaphoideus titanus*) lárvakelése 2024. évben május második hetében volt tapasztalható. Május harmadik hetében az első lárvastádiumú egyedek az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által vizsgált szőlőnövényeken már mindenhol megtalálhatóak voltak. Az amerikai szőlőkabóca elleni védekezés azért különösen fontos, mert a szőlő egyik veszélyes betegsége, a szőlő aranszínű sárgaság betegséget okozó *Grapevine flavescence dorée* zárlati károsító (a továbbiakban: zárlati károsító) járványszerű terjedésében játszik szerepet.

E kórokozó az elmúlt években a Balaton-felvidéki és a Badacsonyi borvidékeken egyre több helyen azonosításra került, ami miatt az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a Badacsonyon, a Tóti-hegyen, a Szent György-hegyen, a Csobáncon, a Gulácson, a balatonedericsi Öreghegyen, valamint Hegyesd, Nemesvita, Lesencetomaj, Lesenceistvánd és Lesencefalu, Mindszentkállya, Révfülöp és Szigliget települések szőlőültetvényeiben növényegészségügyi zárlatot rendelt el, illetve határaiktól számított 3 km sugarú részeken puffer zónákat (továbbiakban együtt: körülhatárolt terület) jelölt ki. A betegség e borvidékeken a korábbi években elszórtan betegített meg egy-egy, érzékeny fajták esetében esetleg pár tucat szőlő növényt szőlőültetvényenként. Ettől eltérően 2023. évben a betegség a Szent György-hegyen egyes szőlőültetvényekben már járványos mértéket öltött, sőt a betegség jellegzetes tüneteit mutató növények aránya négy ültetvényben jóval meghaladta a 30 %-ot, ezért ezen ültetvények teljes felszámolásra kerültek.

Az amerikai szőlőkabócáról is elmondható, hogy az elmúlt évek során a Badacsonyi borvidék és a Balaton-felvidéki borvidék szőlőültetvényeiben egyaránt megtalálható. A lárvái egyre több ültetvényben, egyre nagyobb egyedszámban fellelhetők, a sárgalapok pedig nagy egyedszámban, a védekezési küszöb felett fogják a kifejlett szárnyas egyedeket.

Ezek miatt az amerikai szőlőkabóca a már fertőzött ültetvényekben újabb és újabb szőlőnövényeket fertőz meg, illetve a még nem fertőzött ültetvényekben megbetegedést okoz. Mivel a fertőzött szőlőnövényeket gyógyítani nem lehet, a **védekezés csak a megelőzésre szűkül, ezért különösen fontos** a szőlőültetvényekben a zárlati károsító járványos elterjedésében szerepet játszó amerikai szőlőkabóca, mint **vektor elleni védekezés**. A körülhatárolt területeken - az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv növényegészségügyi zárlatot elrendelő határozatai alapján - **kötelező a rovarvektorok ellen évente 3 alkalommal történő növényvédő szerek védekezés,**

melyet a védekezés optimális idejére vonatkozó hirdetményi úton közzétett védekezési felhívások figyelembevételével kell végrehajtani.

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv vizsgálatai szerint a Badacsonyi Borvidék és Balaton-felvidéki Borvidék szőlőültvényeiben **az amerikai szőlőkabóca tömeges lárvakelése 2024. évben május harmadik hetében volt tapasztalható.** Erre, illetve a szőlőnövények előrehaladott fejlettségére tekintettel a lárvák elleni **első kezelést a szőlő virágzása után, de legkésőbb június 15-éig, a második kezelést, ez első kezelés után 2-3 hét múlva, de legkésőbb július első hetében kell elvégezni.**

A kifejlett egyedek elleni harmadik kezelésre újabb védekezési felhívás kerül kiadásra a kabóca csapdák fogási eredményei alapján.

**A védekezésre a felhívás mellékletének táblázatban szereplő rovarölő szerek alkalmazhatók.**

Megjegyzendő, hogy az amerikai szőlőkabóca fiatal lárvái a szőlőnövények törzsein található hajtásokon is táplálkozik, ezért az eredményes védekezés feltétele, hogy a kötelező kezelések előtt a szőlőnövényeken a törzstisztítás elvégzésre kerüljön, vagy amennyiben nem történik meg, a kezelések a tőhajtásokat is érik. Továbbá a védekezés hatékonyságát növeli, ha a lárvák elleni védekezés során legalább egyszer felszívódó növényvédő szer kerül felhasználásra.

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv felhívja a szőlőtermelők figyelmét, hogy a védekezés során az integrált növényvédelem alapelveinek érvényre jutása érdekében a növényvédelmi technológia meghatározása során figyelemmel kell lenni a rezisztencia kialakulásának megelőzésére, ezért a növényvédő szerek okirataiban meghatározott kezelések évenkénti maximális számának betartása mindenkor szükséges. Ezen túl figyelmet kell fordítani a növényvédő szer használat sorrendjére is, hogy az utolsó, harmadik kezelés során olyan növényvédő szert tudjanak még kijuttatni, amely az akkori szőlő fenosztádiumban még engedélyezett és az élelmezés-egészségügyi várakozási idő is betartható legyen, valamint védelmet nyújtson az amerikai szőlőkabóca kifejlett alakja ellen is.

Jelen felhívás az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv szakmai javaslatának is tekintendő, így az agrár-környezetvédelmi programban szereplő támogatást igénylők egyszeri alkalmazásra az engedélyben foglaltaknak megfelelően felhasználhatják a környezetkímélő besorolásba nem került növényvédőszer-hatóanyagokat. Az agrár-ökológiai programban pedig a méhekre veszélyes szerek használati tilalma ültetvényekben gyakorlatot választóknak az engedélyokirat alapján méhekre kifejezetten vagy mérsékelten veszélyes, illetve kockázatos besorolású növényvédő szerek használata tilos.

**Veszprém, 2024.05.23.**

**Takács Szabolcs főispán**

**nevében és megbízásából:**



**Odor Tamás**  
**osztályvezető**

## 1. számú melléklet a 2024. évi védekezési felhíváshoz

	Kabócák ellen engedélyezett szerek szőlőben	Hatóanyag	Forgalmazási kategória	A kezelés évenkénti maximális száma	Két kezelés között eltelt minimális időtartam	Az utolsó kezelés fenostádiuma	Méhveszélyesség
Kontakt	Decis <sup>1</sup>	deltametrin	III.	2	14 nap	zsendülés (BBCH 85)	mérsékelten kockázatos
	Decis Mega (PL) <sup>1</sup>	deltametrin	II.	3	14 nap	zsendülés (BBCH 85)	mérsékelten kockázatos
	Decis Forte <sup>1</sup>	deltametrin	I.	2	14 nap	szedés érettség (BBCH 87)	mérsékelten kockázatos
	Detector <sup>1</sup>	deltametrin	I.	2	14 nap	szedés érettség (BBCH 87)	mérsékelten kockázatos
	Kaiso Garden <sup>2</sup>	lambda-cihalotrin	III.	1	-	fűtzáródás (BBCH 78)	mérsékelten kockázatos
	K1 <sup>2</sup>	lambda-cihalotrin	III.	1	-	fűtzáródás (BBCH 78)	mérsékelten kockázatos
	Kaiso EG <sup>2</sup>	lambda-cihalotrin	II.	1	-	fűtzáródás (BBCH 78)	mérsékelten veszélyes
	Kaiso Sorbie <sup>2</sup>	lambda-cihalotrin	II.	1	-	fűtzáródás (BBCH 78)	mérsékelten veszélyes
	Wakizasi <sup>2</sup>	lambda-cihalotrin	II.	1	-	fűtzáródás (BBCH 78)	mérsékelten veszélyes
	Hunter <sup>2</sup>	lambda-cihalotrin	II.	1	-	fűtzáródás (BBCH 78)	mérsékelten veszélyes
	Jager EG <sup>2</sup>	lambda-cihalotrin	II.	1	-	fűtzáródás (BBCH 78)	mérsékelten veszélyes
	Karate Zeon 5 CS (BG, PL, RO) <sup>2</sup>	lambda-cihalotrin	III.	2	10 nap	fűtzáródás (BBCH 78)	mérsékelten kockázatos
	Karate Zeon 050 CS <sup>2</sup>	lambda-cihalotrin	III.	2	10 nap	fűtzáródás (BBCH 78)	mérsékelten kockázatos
	Ninja Zeon 5 CS <sup>2</sup>	lambda-cihalotrin	III.	2	10 nap	fűtzáródás (BBCH 78)	mérsékelten kockázatos
	Kendo 5 CS <sup>2</sup>	lambda-cihalotrin	III.	2	10 nap	fűtzáródás (BBCH 78)	mérsékelten kockázatos
	Full 5 CS <sup>2</sup>	lambda-cihalotrin	III.	2	10 nap	fűtzáródás (BBCH 78)	mérsékelten kockázatos
	Lamdex Extra <sup>2</sup>	lambda-cihalotrin	III.	2	10 nap	fűtzáródás (BBCH 78)	mérsékelten veszélyes
	Klartan 24 EW	tau-fluvalinát	II. ; III.	2	14 nap	érés kezdete, bogószíneződés (BBCH 80)	nem jelölésköteles
	Mavrik 24 EW	tau-fluvalinát	II. ; III.	2	14 nap	érés kezdete, bogószíneződés (BBCH 80)	nem jelölésköteles
	Monospel 24 EW	tau-fluvalinát	II. ; III.	2	14 nap	érés kezdete, bogószíneződés (BBCH 80)	nem jelölésköteles
Felszívódó	Laser	spinozad	II.	2	7 nap	két héttel a betakarítás előtt (BBCH 84)	mérsékelten kockázatos
	Nexsuba	spinozad	II.	2	7 nap	két héttel a betakarítás előtt (BBCH 84)	mérsékelten kockázatos
	Laser Duplo <sup>3</sup>	spinozad	II. ; III.	2	7 nap	két héttel a betakarítás előtt (BBCH 84)	mérsékelten kockázatos
	Sivanto Prime <sup>2,4</sup>	flupiradifuron	II.	1	-	zsendülés (BBCH 81)	nem jelölésköteles
	Sanium System <sup>2</sup>	flupiradifuron	II. ; III.	1	-	érés kezdete (BBCH 82)	nem jelölésköteles
	Deltam System <sup>2</sup>	flupiradifuron	II. ; III.	1	-	érés kezdete (BBCH 82)	nem jelölésköteles
	Sivanto Energy	deltametrin + flupiradifuron	I.	2	14 nap	érés kezdete (BBCH 81)	kifejezetten veszélyes
	Exirel <sup>1</sup>	ciántraniliprol	I.	2	14 nap	zsendülés (BBCH 85)	kifejezetten veszélyes
	Mospilan 20 SG (DE, RO) <sup>4</sup>	acetamiprid	III.	1	-	érés (BBCH 89)	nem jelölésköteles
	Rafting <sup>4</sup>	acetamiprid	III.	1	-	érés (BBCH 89)	nem jelölésköteles
Spilan 20 SG <sup>4</sup>	acetamiprid	III.	1	-	érés (BBCH 89)	nem jelölésköteles	
Gazelle 20 SG <sup>4</sup>	acetamiprid	III.	1	-	érés (BBCH 89)	nem jelölésköteles	

## Megjegyzés:

<sup>1</sup> agrár-környezetvédelmi programban tiltott, de egy alkalommal a kormányhivatal szakmai javaslata alapján felhasználható

<sup>2</sup> agrár-környezetvédelmi programban csak növényvédelmi képesítéssel rendelkező szaktanácsadó, növényvédelmi mérnök, növényorvos írásbeli javaslatára használható

<sup>3</sup> ökológiai gazdálkodásban is engedélyezett a felhasználása

<sup>4</sup> tebukonazol tartalmú növényvédő szerrel együtt tankkeverékként alkalmazva, virágzó kultúrákban vagy mézharmat és virágzó gyomnövények elenléte esetén, illetve ha a területet bármely okból a méhek látogatják, kizárólag méhkímélő technológiával juttatható ki.